




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

# Přírodní památka POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ

Evropsky významná lokalita

## MAPA OKOLÍ



## ORTOFOTO



## LETECKÝ SNÍMEK



Od roku 2009 je zdejší území evidováno jako evropsky významná lokalita k ochraně zachovalého komplexu přechodových rašelinišť, vrchovišť, rašelinných lesů, horských smilkových luk a acidofilních smrčín. Národní ochranu této lokality zajišťuje stejnojmenná přírodní památka o shodné rozloze (cca 157 ha), která byla vyhlášena v roce 2023 a aktuálně chrání soubor uvedených biotopů s výskytem velkého množství vzácných a ohrožených organismů. Z hlediska biogeografického členění se území nachází v novohradském bioregionu, ve fytogeografickém podokrese Novohradské hory, v nadmořské výšce cca 890–970 m n. m.

Zdejší floru lze považovat za poměrně dosti bohatou. Inventarizační průzkum z roku 2019 doložil výskyt cca 300 taxonů rostlin, z toho 16 druhů zvláště chráněných. Na rašeliništích dominují mechy **rašeliníky** (*Sphagnum* sp.) a **ploníky** (*Polytrichum* sp.). Typický rašeliništní prvek představují také suchopýry, jejichž klásky s dlouhými bílými chlupy vyhlížejí jako chomáčky vaty. Roste tady **suchopýr úzkolistý** (*Eriophorum angustifolium*) s více klásky a **suchopýr pochvatý** (*Eriophorum vaginatum*) s jedním kláskem na vrcholu lodyhy. Po porostech rašelínky se hojně plazí **klikva bahenní** (*Oxycoccus palustris*) s drobnými listy, hezkými růžovými květy a následně velkými červenými bobulemi. Na otevřená vrchoviště s rašeliničky se váže přítomnost vzácného stálezeleného keříčku **kyhanky sivolisté** (*Andromeda polifolia*) s růžovými kvítky ve tvaru zvonečku a úzkými listy, které jsou z rubové strany sivé.

Na rašeliniště navazují plochy bývalých horských luk, pastvin a lesních lemů. Charakteristický prvek horských luk **rdesno hadí kořen** (*Bistorta major*) poznáte podle růžových kvítků v hustém klasovitém květenství. Za typický prvek nízkostébelných trávníků platí nenápadná tráva **smilka tuhá** (*Nardus stricta*), která tvoří trsiky tuhých štětinovitých listů. Smilkové trávní-



kyhanka sivolistá



prha arnika

ky zejména lesních okrajů hostí žluté kvetoucí rostlinu jménem **prha arnika** (*Arnica montana*) s okrouhlými listy v přízemní růžici. Jedná se tradiční léčivý druh, dříve místy hojně sbíraný, dnes zákonem chráněný. Ojediněle se objevuje drobná kapradina **vratička měsíční** (*Botrychium lunaria*), která dorůstá jen několika centimetrů. Častěji se vyskytuje další růžové kvetoucí druh **všivec lesní** (*Pedicularis sylvatica*) s květy ve tvaru „tlamíček“. Za charakteristický druh pošumavských mokřin a rašelinných luk můžeme považovat žluté kvetoucí **plešku stopkatou** (*Willemetia stipitata*).

Své zastoupení na lokalitě mají i orchideje – **prstnatec májový** (*Dactylorhiza majalis*) s hustým červeno-fialovým květenstvím a **prstnatec Fuchsův** (*Dactylorhiza fuchsii*) se světlejším květenstvím a krásnou fialovou kresbou na dolním pysku jednotlivých květů. Potoky doprovází bíle kvetoucí **pryskyřník omějolistý** (*Ranunculus aconitifolius*) nebo **kamzičník rakouský** (*Doronicum austriacum*) se žlutými květy. Nejnápadnější zdejší rostlinu představuje **kýchavice bílá** (*Veratrum album*), která běžně přesahuje výšku jednoho metru a kvete v létě mohutným květenstvím bílých květů. Kýchavice bývá považována za původní druh, i když nelze vyloučit, že byla podpořena výsadbami zdejších obyvatel.



suchopýr úzkolistý



klikva bahenní



kýchavice bílá

Z vůbec nejvýznamnějších místních skvostů můžeme jmenovat drobnou a nenápadnou orchidej **bradáček srdčitý** (*Listera cordata*) a ještě drobnější a nenápadnější kapradinu **vratičku heřmánkolistou** (*Botrychium matricariifolium*). Jedná se o druhy kriticky ohrožené. V podrostu lesů rostou **dřípatka horská** (*Soldanella montana*), která kvete na jaře jemnými fialovými zvonečky nebo **plavuň pučivá** (*Lycopodium annotinum*), která vytváří svěže zelené poléhavé koberce.


Pro faunu brouků je typické zastoupení horských a podhorských druhů a rovněž druhů vázaných na vlhké mokřadní lokality, břehy vod a rašeliniště. K nejvýznamnějším zástupcům patří **střevlík Menetriesův** (*Carabus menetriesi pacholei*), který se u nás vyskytuje pouze na rašeliništích Šumavy, Novohradských a Krušných hor. Tento velký tmavý střevlík žije pouze na původních rašeliništích. Imago i larva loví drobné bezobratlé jako slímáky nebo hmyzí larvy, případně pavouky. Dospělcům chybí křídla, pohybují se rychlým během a aktivují především v nočních hodinách.

Pro ohrožená motýlí společenstva jsou nejzajímavější nelesní části území. Poměrně početně se zde vyskytuje silně ohrožený **žlutásek borůvkový** (*Colias palaeno*), jehož žlutá křídla mají černé lemování. Motýli v letním období pobývají zejména na rašelinných biotopech

Z obojživelníků zde ve stabilní populaci žije **čolek horský** (*Triturus alpestris*), jehož samečci mají v době páření nápadný svatební šat s modrými pruhy na bocích. Méně zastoupený je **čolek obecný** (*Triturus vulgaris*). Chladný vlhký biotop vyhovuje **ještěrce živorodé** (*Zootoca vivipara*), která přivádí na svět živá mláďata. Oplozená vajíčka totiž nosí ve svém těle a klade je až v okamžiku líhnutí. Zájmové území obývá také náš jediný jedovatý had **zmije obecná** (*Vipera berus*). V horní čelisti má zmi je pár dutých jedových zubů, které jsou v zavřeně tlamě sklopené špičkou dozadu a při otevření tlamy se kolmo vztýčí. Zmije je plachá a bez podráždění neútočí. Na její jídelníček patří myši, žáby, ještěrky a hmyz.



žlutásek borůvkový



perletovec mokřadní



sluka lesní



bekasina otavní

s vložiny, kde probíhá larvální vývoj nové generace. Na mezofilních a vlhkých květenatých loukách sídlí početná populace **perletovec mokřadního** (*Boloria eunomia*), nepřehlédnutelného motýla s oranžovo-černými křídly, a **hnědáška jitrocelového** (*Melitaea athalia*) s oranžovou kresbou.

Mozaiku rašelinišť, mokřadů a rašelinných luk obkrouženou lesy daleko od lidských sídel si za své útočiště zvolily **sluka lesní** a **bekasina otavní** – dříve druhy lovené, dnes hodně vzácné. Jedná se o tažné ptáky se skrytým způsobem života, kteří aktivují zejména za soumraku. **Sluka lesní** (*Scolopax rusticola*) dorůstá velikosti holuba a má dlouhý rovný zobák. Tokající samec se na jaře ozývá hlubokým opakovaným **kvorr**. **Bekasina otavní** (*Gallinago gallinago*) nepřesahuje velikost kosa, zato má ještě delší zobák. Samec na jaře vydává mečivé zvuky, které vznikají vibrací vzduchu o ocasní pera, když pták letí střemhlav dolů. Dlouhými zobáky oba druhy vyhledávají potravu v mokřem bahňitém terénu.

Z dalších velmi vzácných druhů ptáků na zdejších loukách bydlí **chrástal polní** (*Crex crex*), který vede skrytý způsob života a dává o sobě vědět jen hlasovými projevy. V lesích Stodůleckého vrchu žije **kulíšek nejmenší** (*Glaucidium passerinum*) – naše nejmenší sova, která dosahuje sotva velikosti špačka. Navzdory malým rozměrům, má kulíšek silné drápy a dokáže ulovit kořist větší, než je on sám.

Fotografie:

Alexandra Čurnová: klikva bahenní, kyhanka sivolistá, kýchavice bílá, prha arnika, suchopýr úzkolistý / Zdeněk Hanč, fotohanc.com: perletovec mokřadní, žlutásek borůvkový /

Autor textu:

EIA SERVIS s. r. o., U Malše 20, České Budějovice

Mapové podklady:

mapa okolí: podkladová mapa 1:100 000, © CEDA Maps a. s.; územně analytické podklady JČK, © Jihočeský kraj  
ortofoto: ortofoto ČR 2021, © ČÚZK; územně analytické podklady JČK, © Jihočeský kraj  
letecký snímek: archiv JČK, © Jihočeský kraj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.



Jihočeský kraj

